



Očkovanie detí s reumatickými ochoreniami

Úvod

Reumatické ochorenia v detskom veku sú chronické, so striedajúcimi si obdobiami vyššej či nižšej aktivity prípadne remisie. Väčšina z nich je spojená so zvýšeným rizikom výskytu infekcií, ktoré je potenciovane dlhodobou imunosupresívnou liečbou. Očkovanie je účinný spôsob profylaxie infekčných ochorení.

Náš postoj k očkovaniu

Ochorenia, proti ktorým sa t.č. povinne očkuje podľa Očkovacieho kalendára SR, sú závažné a potenciálne život ohrozujúce. Epidemiologické údaje jednoznačne potvrdzujú účinnosť očkovania. Vzhľadom na obrovský počet vykonaných očkovaní a zvyšujúcu sa bezpečnosť vakcín, je výskyt komplikácií očkovania veľmi malý, a preto očkovanie zdravých detí podľa platných odporúčaní považujeme za bezpečné a prínosné. O očkovaní (podobne ako o infekciách, zhoršujúcom sa životnom prostredí, strese a pod.) sa uvažuje ako o jednom z mnohých možných spúšťačov autoimunitných a teda aj reumatických ochorení, ale na základe v súčasnosti dostupných údajov nie je možné takúto priamu súvislosť potvrdiť, a preto očkovanie ani odmietnuť.

Očkovanie detí s reumatickými ochoreniami

Deti s reumatickými ochoreniami sú vystavené zvýšenému riziku infekcií, ktoré môžu mať vzhľadom na dlhodobú imunosupresívnu liečbu závažnejší priebeh. Očkovanie je účinné aj u pacientov na dlhodobej imunosupresívnej liečbe, i keď jeho účinnosť môže byť v závislosti od intenzity imunosupresie nižšia. Za dodržania doleuvedených odporúčaní, je očkovanie u detí s reumatickými ochoreniami bezpečné. Naše odporúčania vychádzajú z odporúčaní Európskej ligy proti reumatizmus a expertov na očkovanie.

Odporúčania:

- 1) Vo všeobecnosti sa u detí s reumatickými ochoreniami odporúča **očkovať podľa bežného očkovacieho kalendára** za predpokladu dodržania doleuvedených zásad.
- 2) **V aktívnom ochorení** nie je vhodné očkovať žiadnymi vakcínami. K stavu (aktivite) ochorenia sa vyjadří detský reumatológ.
- 3) **Pri inaktivite ochorenia** je možné očkovať
 - a) neživými vakcínami (DI, TE, Per, Pnc, Hib, IPV, HBV, HAV, HPV, influenza) aj počas imunosupresívnej liečby (vrátane biologík)
 - b) živými očkovacími látkami (MMR, OPV, VZV) až 3-6 mesiacov po ukončení imunosupresívnej liečby
- 4) **Súrodenci pacientov** s reumatickým ochorením sa nemajú očkovať živými **očkovacími látkami** počas imunosupresívnej liečby ich súrodenca. Očkovanie neživými očkovacími látkami u nich nie je obmedzené.
- 5) Podanie intrakartilárnych kortikoidov (najmä triamcinolon-hexacetonidu) neovplyvňuje účinnosť ani riziko plynúce z očkovania a dieťa môže byť očkované bez obmedzení.
- 6) Ostatné zásady sa riadia všeobecnými odporúčaniami na očkovanie detí.

Pri ďalších otázkach sa na nás prosím obráťte telefonicky alebo mailom.

MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
Reumatologická ambulancia 2. DK DFNSP